

## Frowein-TVT-Score zur Einschätzung des Thromboserisikos (nach Frowein 1997)

Risikofaktoren	Kategorie	P	Kategorie	P	Kategorie	P
<b>Gefäßwandschädigung</b>						
Varikosis	nein	0	leicht	1	stark	4
frühe Thrombose/Lungenembolie	nein	0	ja	4		
AVK	nein	0	Stadium I – IIa	2	Stadium IIb – IV	4
Alter	40	1	> 60	2	> 70	3
<b>Hämodynamik</b>						
Mobilität	mobil	0	teilmobil (bis ca. 12 Std./Tag)	2	immobil (länger als 72 Std. ununterbrochen)	4
Lähmungen	nein	0	Querschnittlähmung Halbseitenlähmung	3		
Frakturen	nein	0	Unterschenkel	2	Oberschenkel	7
Stützverband	nein	0	Gehgips	3	Liegegips	7
Herzinsuffizienz	nein	0	Stadium I – III	3	Stadium IV	6
Myokardinfarkt	nein	0	ja	4		
Schwangerschaft	nein	0	ja	1		
postpartal	nein	0	ja	2		
Übergewicht	nein	0	>15% (nach Broca)	2	>20% (nach Broca)	
<b>Blutzusammensetzung</b>						
schwere Entzündung	nein	0	ja	7		
Sepsis	nein	0	ja	7		
maligner Tumor	nein	0	ja	7		
Operation	kleine Eingriffe < 30 Minuten	1	Allgemeinchirurg. OP > 30 Minuten	3	Malignom-OP, große urol., gyn. u. orthopäd. Eingriffe > 30 Minuten	7
schwere Verletzungen	nein	0	ja	7		
orale Kontrazeption	nein	0	ja	2		
Rauchen	nein	0	ja	2		
<b>Punkte</b>	<b>Thromboserisiko</b>		<b>◀ Spaltensumme</b>		<b>◀ Spaltensumme</b>	<b>◀</b>
0	keines		<b>Gesamtsumme: _____</b>		<b>Thromboserisiko: _____</b>	
1 – 3	gering					
4 – 6	mittel					
7 – maximal	hoch					

